

Галлюциногенные грибы



Мухомор красный (*Amanita muscaria*)

- **Мухомор красный** (лат. *Amanita muscaria*) — ядовитый психоактивный гриб рода Мухомор, или Аманита (лат. *Amanita*) порядка агариковых (лат. *Agaricales*), относится к базидиомицетам.
- Мухомор красный растёт в хвойных, лиственных и смешанных лесах, особенно в березняках. Встречается часто и обильно одиночно и большими группами с июня до осенних заморозков.
- Шляпка до 20 см в $\emptyset$, сначала *шаровидная*, затем *плосковыпуклая*, ярко-красная, оранжево-красная, поверхность усеяна белыми или слабо-желтыми многочисленными бородавками. Цвет кожицы может быть различных оттенков от оранжево-красного до ярко-красного, с возрастом светлеет. У молодых грибов хлопья на шляпке отсутствуют редко, у старых могут смыться дождём. Пластинки иногда приобретают светло-жёлтый оттенок.
- Мякоть *белая*, под кожицей желтоватая, мягкая, без запаха.
- Пластинки частые, свободные, белые, у старых грибов желтеющие.
- Споровый порошок белый. Споры эллипсоидные, гладкие.
- Ножка до 20 см длины, 2,5— 3,5 см $\emptyset$, цилиндрическая, у основания клубневидная, сначала плотная, затем полая, белая, голая, с белым или желтоватым кольцом. Клубневидное основание ножки сросшееся с мешковидным влагалищем. Основание ножки покрыто белыми бородавками в несколько рядов. Кольцо белое.
- Гриб ядовит. Симптомы отравления проявляются через 20 мин и до 2 ч после приема пищи. Источник материала: <http://wikigrib.ru/muxomor-krasnyj/>

Псилоцибе полуланцетовидная

- **Псилоцибе полуланцетовидная** (*Psilocybe semilanceata* (Fr.) P. Kumm. 1871;) — вид грибов семейства строфариевых. Содержит псилоцибин и псилоцин, обладающие психоактивными свойствами, поэтому относится к несъедобным галлюциногенным грибам.
- Псилоцибе полуланцетовидная — пластинчатый гриб. **Шляпка** размерами от 5 до 25 мм, её высота в полтора раза больше ширины, форма от полукруглой до конической, на конце маленький бугорчик, край может быть свёрнут трубкой, поверхность гладкая, тонкомясистая. Слизистая кожица шляпки снимается особенно легко у молодых экземпляров. Цвет от бежевого в сухих условиях до коричневого с оливковым оттенком во влажных условиях иногда полосат. **Мякоть** при повреждении и высыхании синеет. **Ножка** светлее шляпки, крепкая, гибкая, эластичная, гладкая или с чешуйками в начале, без каймы. Пластины тёмные, иногда чёрные, реже — серые.
- Псилоцибе полуланцетовидная предпочитает расти среди травы на удобряемых скотом полянах, во влажных местах, на кочках, на орошаемых поверхностях. Основное время роста приходится на конец августа — середина января, в основном в сентябрь и ноябрь.
- Псилоцибе полуланцетовидная содержит психоактивные вещества из группы триптаминов, которые оказывают психоделическое действие на ЦНС.
- Содержание веществ в грибах может варьироваться в зависимости от условий, в которых они росли, индивидуальная восприимчивость людей к этим веществам также меняется от человека к человеку, поэтому можно сказать только что уже несколько десятков грибов могут оказать на психику человека значительный эффект.
- Псилоцибе полуланцетовидная действует приблизительно 4—7 часов после отравления. Начало действия отравления наблюдается через 20—45 (грибной отвар может начать действовать уже через 10 минут), возрастание до пика занимает еще около 1 часа, а сам пик длится 2—3 часа, после чего следует спад в течение 1—2 часов. **Возможна частичная или полная потеря разума (безумие)** из-за сильного изменения сознания, которое может быть необратимо или для выхода из этого состояния потребуются помощь профессиональных психиатров. После окончания действия грибов еще приблизительно в течение нескольких суток может остаться последствие, называемое иногда «послесвечением» (от англ. afterglow), которое может быть выражено общим состоянием умиротворения и небольшим усилением восприятия или же наступлением депрессии с поисками смысла существования.
- *Психоделическое действие этих грибов также называют **трипом**. Употребляющие грибы описывают их действие как более «мягкое» по сравнению с синтетическими фенэтиламинами, и более «природное», чем действие ЛСД.* Источник материала: <http://wikiqrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/>

Панеолус мотыльковый

- **Псилоцибе полуланцетовидная** (*Psilocybe semilanceata* (Fr.) P. Kumm. 1871;) — вид грибов семейства строфариевых. Содержит псилоцибин и псилоцин, обладающие психоактивными свойствами, поэтому относится к несъедобным галлюциногенным грибам.
- Псилоцибе полуланцетовидная — пластинчатый гриб. **Шляпка** размерами от 5 до 25 мм, её высота в полтора раза больше ширины, форма от полукруглой до конической, на конце маленький бугорчик, край может быть свёрнут трубкой, поверхность гладкая, тонкомясистая. Слизистая кожица шляпки снимается особенно легко у молодых экземпляров. Цвет от бежевого в сухих условиях до коричневого с оливковым оттенком во влажных условиях иногда полосат. **Мякоть** при повреждении и высыхании синеет. **Ножка** светлее шляпки, крепкая, гибкая, эластичная, гладкая или с чешуйками в начале, без каймы. Пластины тёмные, иногда чёрные, реже — серые.
- Псилоцибе полуланцетовидная предпочитает расти среди травы на удобряемых скотом полянах, во влажных местах, на кочках, на орошаемых поверхностях. Основное время роста приходится на конец августа — середина января, в основном в сентябрь и ноябрь.
- Псилоцибе полуланцетовидная содержит психоактивные вещества из группы триптаминов, которые оказывают психоделическое действие на ЦНС.
- Содержание веществ в грибах может варьироваться в зависимости от условий, в которых они росли, индивидуальная восприимчивость людей к этим веществам также меняется от человека к человеку, поэтому можно сказать только что уже несколько десятков грибов могут оказать на психику человека значительный эффект.
- Псилоцибе полуланцетовидная действует приблизительно 4—7 часов после отравления. Начало действия отравления наблюдается через 20—45 (грибной отвар может начать действовать уже через 10 минут), возрастание до пика занимает еще около 1 часа, а сам пик длится 2—3 часа, после чего следует спад в течение 1—2 часов. **Возможна частичная или полная потеря разума (безумие)** из-за сильного изменения сознания, которое может быть необратимо или для выхода из этого состояния потребуются помощь профессиональных психиатров. После окончания действия грибов еще приблизительно в течение нескольких суток может остаться последствие, называемое иногда «послесвечением» (от англ. afterglow), которое может быть выражено общим состоянием умиротворения и небольшим усилением восприятия или же наступлением депрессии с поисками смысла существования.
- *Психоделическое действие этих грибов также называют **трипом**. Употребляющие грибы описывают их действие как более «мягкое» по сравнению с синтетическими фенэтиламинами, и более «природное», чем действие ЛСД.* Источник материала: <http://wikiqrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/>

Серная голова (*Hyrpholoma cyanescens*)

- **Время сбора:** Август — конец декабря.
Местонахождение: по отдельности или небольшими группами, на упавших деревьях, бревнах и в сырой траве.
- *Шляпка*
Размеры: 25-50 мм Ø.
Форма: в очень молодом возрасте — конусообразная, затем в форме колокола или груди, в конце плоская или вогнута наверх.
Цвет: желтый, если сухо, каштановый, если влажно. Голубые пятна на поврежденных местах.
Поверхность: гладкая и прочная, если сухо, немного клейкая, если сыро, ломкая в старости.
Край: после того, как шляпка уже плоская, край растет дальше и завивается.
- *Ножка*
Размеры: 25-100 мм высотой, 3 — 6 мм в Ø.
Форма: равномерно толстая и слегка согнута, заметное утолщение в нижней четверти, часто находятся остатки кожицы оболочки.
Цвет: сверху почти белый, внизу янтарного цвета, при сухости легкий голубой оттенок.
Поверхность: хрупкая с шелковистыми волокнами.

Спороносный слой
Цвет: сначала цвета корицы, потом красновато-коричневый с черно-пурпурными пятнами (от спелых спор, которые падают).
Расположение: не плотно, adnat.
- **АКТИВНОСТЬ:** очень высокая. Источник материала: <http://wikigrib.ru/sernaja-golova/>

Псилоцибе Монтана (*Psilocybe montana*)

- **Время сбора:** Конец июля — начало декабря.
Местонахождение: Среди мха, лишайника и папоротника, на песчаных почвах в лесах.
- *Шляпка*
Размеры: диаметр 6 — 25 мм, высота в половину меньше ширины.
Форма: от полукруглой до вытянутого полукруга, похожа на грудь, часто с отчетливым ниппелем.
Цвет: Серо-коричневый, если сухо, коричневый с оттенком охры, если сыро.
Поверхность: Гладкая, тонко-мясистая, с зарубками от края наружу до полурадиуса.
- *Ножка*
Размеры: 25 — 75 мм высотой, 3 мм в Ø.
Форма: в основном равномерно крепкая, изогнутая, в основании утолщенная.
Цвет: коричневый, несколько светлее к шляпке.
Поверхность: гладкая без кольца (вуаль/кайма).
- *Спороносный слой*
Цвет: сначала светло-, позже темно-коричневый.
Расположение: далеко друг от друга, соединен с ножкой (adnat), спороносный слой почти треугольный.
- **АКТИВНОСТЬ:** умеренная до средней, всегда меньше чем у *Psilocybe semilanceata*. Источник материала: <http://wikigrib.ru/montana/>

Спасибо за просмотр

- **Внимание! Умышленный сбор и употребление галлюциногенных грибов запрещены законодательством Российской Федерации и многих других стран.**
- (Очень смешно парни!!!!!!!!!!!!!!)